

Цепна АЛАТКА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ПОТРЕС НА МОЗОКОТ

Помага за идентификација на потрес на мозок кај деца, малди и возрасни



ПРЕПОЗНАЈ & ОДСТРАНИ

За потрес се сомневаме **ако еден или повеќе** од следните видливи траги, знаци, симптоми или присутни грешки во прашањата за меморија.

1. Видливи траги суспектни за ПОТРЕС

Било кој или повеќе од следните видливи траги може да индицира Потрес:

- Губење на свест или нама одговор
- Лежи неподвожен на земја / бавно се дига
- Нестабилен на нозе / Проблем со рамнотежа или паѓање некоординиран, ја граби / стиска главата
- Збунет, со празен или отсутен поглед
- Конфузен/ не е свесен за местото и настанот

2. Знаци и симптоми суспектни за ПОТРЕС

присуство на било кој и повеќе од следниве знаци& симптоми моќе да сугерира Потрес:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Губење на свест | - Главоболка |
| - Одземен. или грчеви | - Dizziness |
| - Проблем со баланс | - конфузија |
| - Гадење или поврака | - чувство на успоренос |
| - посланост | - "притисок во глава" |
| - поемотивен | - заматен вид |
| - раздрозлив | - чувствител. На светло |
| - тага | - Амнезија |
| - замор и без енергија | - Чувство во магла" |
| - нервозен вознемир | - Болка во врат |
| - "Не се чувствува ОК" | - Чувствит на бука |
| - тешко памети | - Тешко се концентрир |

3. Меморија

неточен одговор на било кој од овие прашања може да сугерира Потрес.

- "На кое место сме денес?"
- "кое полувреме е сега?"
- "кој постигна последен гол денес?"
- "со која екипа игравте на послед. натпрев?"
- "Дали победивте на послед натпревар?"

Секој спортист суспектен за потрес на мозокот треба да се **ОДСТРАНИ ОД ТЕРЕНОТ** за игра, медицински прегледа, да се набљудува за евентуално влошување(т.е. да не се остава сам) и не смее да вози моторно возило додека не му дозволи докторот.

Препорака е, во ситеслучаи на суспектен потрес,играчот да се однесе на доктор специјалист за дијагноза и менаџирање и одлуката за враќање во игра, дури и ако симптомите се повлекле.

ЦРВЕНО ЗНАМЕ Доколку **БИЛО ШТО** од следново се пријави играчот треба веднаш безбедно да се отстрани од терен. Доколку нема квалификуван доктор, треба да се транспортира со амбулантно возило до соодветна установа за ургентна медицинска проценка:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Играчот се жали на болки во вратот | - влошување на свеста |
| - Зголемена конфуз и раздрозливост | - Силна главоболка |
| - Повторувачки повраќања | - невообичаено однесување |
| - Одземеност или грчеви | - Двојно гледање |
| - трнење или слабост/печење во раце или нозе | |

Запаметите:

- Во сите случаи, базичните принципи на прва помош(опасност, комуникација,дишни патишта,дишење,циркулација) треба да се следат. -не обидувајте се да го движите играчот(поинаку одошто е потребно за обезбедување поддршка на дишните патишта) доколку сте тренирани да го правите тоа
- Не отстранувајте ја кацигата(ако ја има) доколку не сте тренирани за тоа